

**ABRYSVO®**

لقاح البروتين F قبل الاندماج المُعاد تركيبه لفيروس
RSV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي)



لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

ساعدي في حماية طفلك من الفيروس المخلوي
التنفسي منذ أول تنفس.



ABRYSVO هو لقاح الفيروس المخلوي التنفسي الوحيد
المعتمد للاستخدام مع النساء الحوامل.

عزيزتي الأم الحامل،

بالنسبة لمعظم النساء، يُعد الحمل فترة مليئة بالفرح والحماس. وفي الوقت نفسه، هي أيضًا فترة مليئة بالتغيرات ولحظات غير متوقعة. ومع اقتراب موعد ولادتك، ربما تكونين قد اتخذت بالفعل عددًا من الخطوات لرعاية جنينك - وللمساعدة في الاستعداد لما هو غير متوقع بطرق صغيرة ولكنها مهمة.

لقد تلقيت هذا الكتيب لأن طبيبك وصف لك ABRYSSVO للمساعدة في حماية طفلك من الفيروس المخلوي التنفسي، أو RSV اختصارًا. يُعطى ABRYSSVO في حقنة واحدة في الأسبوع 28 إلى 36 من الحمل. بعد حقن ABRYSSVO، ينتج جسمك أجسامًا مضادة للفيروس المخلوي التنفسي، والتي تنتقل إلى طفلك عن طريق المشيمة. ستساعد هذه الأجسام المضادة على حماية طفلك من أمراض المسالك الهوائية والرئة الناجمة عن الفيروس المخلوي التنفسي منذ الولادة وحتى عمر ستة أشهر، في الوقت الذي يكون فيه أكثر عرضة للخطر.

في تجربة سريرية كبيرة أجريت على ما يقرب من 7500 امرأة حامل، ساعد ABRYSSVO في الوقاية من أمراض المسالك الهوائية والرئة لدى أطفالهن خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة. كما أدى ABRYSSVO إلى تقليل عدد مرات دخول المستشفى بسبب الفيروس المخلوي التنفسي لدى هؤلاء الأطفال.



ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ولكنه شائع بشكل خاص لدى الرضع والأطفال الصغار. سيعاني معظم الأطفال من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي في عمر عامين، ومن الممكن الإصابة بالفيروس عدة مرات.

في حين أن الفيروس المخلوي التنفسي عادةً ما يكون عدوى خفيفة، إلا أنه قد يسبب أحياناً عدوى خطيرة في الصدر في المسالك الهوائية الصغيرة (التهاب القصيبات الهوائية) أو أكياس هوائية (التهاب رئوي) داخل الرئتين. والفيروس المخلوي التنفسي هو السبب الرئيسي لهذين النوعين من عدوى الصدر بين الرضع والأطفال الصغار، ويؤدي إلى العلاج بالمستشفى بقدر عدد حالات الإنفلونزا. كما يمكن أن يكون الفيروس المخلوي التنفسي غير قابل للتنبؤ، حيث تحدث معظم حالات دخول المستشفى لأطفال أصحاء سابقاً.

من المعرضون للخطر؟

في الأطفال، تكون المجموعات التالية أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي:

- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر (خاصةً من تقل أعمارهم عن ثلاثة أشهر)
- الأطفال المبتسرون
- الرضع والأطفال الصغار المصابون بحالات طبية أخرى
- السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس والرضع والأطفال الصغار.

ما أعراض الفيروس المخلوي التنفسي لدى الأطفال؟

في الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار، تشمل الأعراض التي قد تلاحظها فقط ما يلي:

- التهيج
- البكاء
- انخفاض النشاط
- النوم لفترة أطول من المعتاد
- صعوبات في التنفس، بما في ذلك توقف التنفس أثناء النوم (انقطاع النفس).

تشمل الأعراض العامة الأخرى التي يجب الانتباه لها لدى الرضع والأطفال الصغار:



فقدان الشهية



العطس



السعال



سيلان الأنف



الحمى



أزيز، ضيق في التنفس



كيف ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي؟

- عن طريق الرذاذ المحمول جواً، والذي يمكن أن ينتقل بسهولة من شخص لآخر عندما يسعل شخص مصاب أو يعطس.
- عن طريق لمس الأشياء الملوثة، مثل الأكواب، والطاولات ومقابض الأبواب وحواجز أسيرة الأطفال، حيث يمكن للفيروس البقاء على الأسطح الصلبة لمدة تصل إلى عدة ساعات.



ما الخطوات اليومية التي يمكن أن تساعد في الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي؟

عادةً ما تظهر الأعراض تدريجيًا بعد ملامسة شخص مصاب بالفيروس المخلوي التنفسي، ويمكن أن تستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في الحد من انتشار العدوى:

- غسل يديك كثيرًا بالماء والصابون
- تجنب مخالطة المرضى عن قرب
- البقاء في المنزل عندما تكون مريضًا
- تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس
- التخلص من المناديل المستخدمة مباشرةً في سلة المهملات
- تنظيف وتطهير أي أسطح أو أجسام قد تكون ملوثة.



التطعيم أثناء الحمل يمكن أن يحمي طفلك

يقدم دليل التطعيم الأسترالي معلومات وإرشادات شاملة حول الاستخدام الآمن والفعال لجميع اللقاحات المعتمدة للاستخدام في أستراليا. تستند هذه الإرشادات إلى أفضل الأدلة العلمية المتاحة من جميع أنحاء العالم. في يونيو 2024، تم تحديث دليل التطعيم الأسترالي للتوصية بلقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) أثناء الحمل. ونتيجة لذلك، يُوصى الآن بثلاثة أنواع من اللقاحات الروتينية للنساء الحوامل:

التوقيت الموصى به	اللقاح
في أي وقت أثناء الحمل	الإنفلونزا
يُفضل في الأسبوع 20 إلى 32 من الحمل (يُعطى مع لقاحات الدفتيريا والتيتانوس)	السعال الديكي (الشاهوق)
في الأسبوع 28 إلى 36 من الحمل	الفيروس المخلوي التنفسي

يُرجى التحدث مع اختصاصي الرعاية الصحية المُتابع لكِ حول أفضل وقت لتلقي اللقاح (اللقاحات).

هناك أدلة كثيرة تثبت أمان التطعيم أثناء الحمل. لم تجد الدراسات السريرية أي دليل على أن هذه اللقاحات تضر بالطفل في طور النمو. تبيّن أن جميع اللقاحات التي تمت الموافقة عليها في أستراليا تقدم فوائد تفوق ما قد ينجم عنها من مخاطر.

اعرفي المزيد عن التطعيم
للنساء الحوامل





ABRYSVO®

لقاح البروتين F قبل الاندماج المُعاد تركيبه لفيروس
RSV (فيروس الجهاز التنفسي المخلوي)

ABRYSVO هو لقاح يُعطى كحقنة واحدة في الأسبوع 28 إلى 36 من الحمل للمساعدة في حماية طفلكِ ضد أمراض المسالك الهوائية والرئة الناجمة عن الفيروس المخلوي التنفسي. كما يمكن إعطاؤه للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.

كما هو الحال مع أي لقاح، قد لا يوفر لقاح ABRYSVO حماية كاملة لكل مَنْ يتلقاه، وقد يسبب بعض الآثار الجانبية. تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا: الألم، أو التورم، أو الاحمرار حول منطقة الحقن، وألم العضلات، والصداع. إذا عانيتِ من آثار جانبية، فمن المحتمل أن تكون بسيطة ومؤقتة.

لم يتم الربط بين لقاح ABRYSVO وأي آثار جانبية خطيرة لدى الرُضّع الذين خضعوا للمتابعة لمدة عامين بعد الولادة.

يخضع هذا اللقاح لمراقبة إضافية.

بما يسمح بالتعرّف بسرعة على أي معلومات جديدة تتعلق بمدى أمانه. ويمكنك المساعدة في هذا بالإبلاغ عن أي آثار جانبية قد تتعرّض لها. ويمكنك إبلاغ طبيبك بالآثار الجانبية، أو الإبلاغ عنها مباشرةً على الموقع www.tga.gov.au/reporting-problems.

لمزيد من المعلومات حول
ABRYSVO، يُرجى قراءة معلومات
للمستهلك عن الدواء (CMI)



تحدثي مع اختصاصي الرعاية الصحية المتابع لك إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول لقاح ABRYSSVO وكيف يمكن أن يساعد في حماية طفلك من الفيروس المخلوي التنفسي.

مزيد من القراءة

يمكن العثور على معلومات إضافية عن الفيروس المخلوي التنفسي عبر Pfizer Your Health:

تطعيم الأمهات



الكشف عن الفيروس
المخلوي التنفسي



يُرجى ملاحظة أن هذا الكتيب يهدف إلى توفير تثقيف عام حول الفيروس المخلوي التنفسي ولقاح ABRYSSVO. لمزيد من المعلومات أو المشورة الطبية، يُرجى استشارة اختصاصي الرعاية الصحية المتابع لك.

© 2025 شركة Pfizer Australia Pty Ltd. Sydney، أستراليا.
جميع الحقوق محفوظة.



معلومات Pfizer الطبية: 1800 675 229
08/2025 PP-A1G-AUS-0477 .AWF- 2691300