

Vietnamese



ABRYSVO®

Recombinant respiratory syncytial
virus pre-fusion F protein vaccine



Tiêm chủng vi-rút hợp bào hô hấp (RSV)

Giúp bảo vệ bé chống lại RSV
ngay từ hơi thở đầu tiên.

ABRYSVO là vắc-xin RSV duy nhất được
phê duyệt để sử dụng cho phụ nữ mang
thai.



Người mẹ tương lai thân mến,

Đối với hầu hết phụ nữ, mang thai là khoảng thời gian của niềm vui và niềm phấn khích lớn lao. Đây cũng là thời điểm của sự chuyển mình và những điều bất ngờ xảy đến. Khi ngày dự sinh của bạn đến gần, có lẽ bạn đã bắt đầu thực hiện một số bước và chuẩn bị cho những biến động nhỏ sắp tới nhưng không kém phần quan trọng để chăm sóc cho thai nhi của mình.

Bạn nhận được tài liệu này vì bác sĩ đã kê đơn ABRYSV0 để giúp bảo vệ em bé chống lại vi rút hợp bào hô hấp, còn được viết tắt là RSV. ABRYSV0 được tiêm dưới dạng một mũi duy nhất trong thời gian từ tuần thứ 28 đến tuần 36 của thai kỳ.

Sau khi tiêm ABRYSV0, cơ thể bạn sẽ sản xuất các kháng thể chống lại RSV và truyền đến em bé qua nhau thai của bạn. Những kháng thể này sẽ chống lại bệnh đường thở và phổi do RSV gây ra, giúp bảo vệ em bé từ sơ sinh đến sáu tháng tuổi vì đây là thời điểm bé dễ bị tổn thương nhất.

Trong một thử nghiệm lâm sàng với quy mô lớn trên gần 7.500 phụ nữ mang thai, ABRYSV0 đã giúp ngăn ngừa bệnh đường thở và phổi ở trẻ sơ sinh trong sáu tháng đầu sau sinh. Tiêm chủng ABRYSV0 cũng làm giảm số ca nhập viện do RSV ở những trẻ sơ sinh này.



RSV là gì?

RSV là một loại virus rất dễ lây lan có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi, nhưng nó đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hầu hết trẻ em bị nhiễm RSV khi hai tuổi và có thể bị nhiễm lại nhiều lần.

Mặc dù RSV thường gây nhiễm trùng nhẹ, nhưng nó cũng có thể gây nhiễm trùng hô hấp dưới nghiêm trọng trong đường thở nhỏ (viêm tiểu phế quản) hoặc trong túi khí (viêm phổi). RSV là nguyên nhân hàng đầu gây ra hai loại nhiễm trùng hô hấp này ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dẫn đến số ca nhập viện nhiều tương đương với bệnh cúm. RSV cũng có thể không đoán trước được, điều này xảy ra với hầu hết các trường hợp nhập viện ở những trẻ sơ sinh khỏe mạnh trước đây.

Ai có nguy cơ bị nhiễm bệnh?

Ở trẻ em, các nhóm sau đây có nguy cơ cao bị biến chứng nghiêm trọng do nhiễm RSV:


- Trẻ sơ sinh dưới sáu tháng tuổi (đặc biệt trẻ dưới ba tháng tuổi)
- Trẻ sinh non
- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có các bệnh lý khác
- Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ người thổ dân Úc và người Đảo Torres Strait.

Các triệu chứng của RSV ở trẻ là gì?

Các triệu chứng mà bạn có thể nhìn thấy ở trẻ bao gồm:

- Khó chịu
- Khóc
- Giảm hoạt động
- Ngủ lâu hơn bình thường
- Khó thở, bao gồm cả tạm dừng thở khi ngủ (chứng ngưng thở).

Các triệu chứng khác cần chú ý ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ bao gồm:



RSV lây lan như thế nào?



- Khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi, bệnh sẽ lây qua bằng các giọt bắn trong không khí, và có thể dễ dàng lây từ người này sang người khác.
- Bằng cách chạm vào các đồ vật bị nhiễm mầm bệnh, chẳng hạn như cốc, bàn, tay nắm cửa và lan can giường, vì vi-rút có thể tồn tại trên các bề mặt cứng tối đa trong vài giờ.



Những hành động hàng ngày nào có thể giúp ngăn ngừa RSV?

Các triệu chứng thường phát triển dần dần sau khi tiếp xúc với người mắc RSV và có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần.

Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để hạn chế sự lây lan:

- Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước
- Tránh tiếp xúc gần với người bệnh
- Ở nhà khi bạn bị ốm
- Che miệng khi ho và hắt hơi
- Vứt khăn giấy vào thùng rác ngay sau khi đã qua sử dụng
- Làm sạch và khử trùng mọi bề mặt hoặc đồ vật có khả năng bị nhiễm bệnh.

Tiêm phòng khi mang thai có thể bảo vệ em bé của bạn



Sổ tay Tiêm chủng Úc cung cấp thông tin và hướng dẫn toàn diện về việc sử dụng an toàn và hiệu quả tất cả các loại vắc-xin đã được phê duyệt sử dụng tại Úc. Hướng dẫn này dựa trên bằng chứng khoa học tốt nhất hiện có từ khắp nơi trên thế giới.

Vào tháng 6 năm 2024, Sổ tay Tiêm chủng Úc đã cập nhật để khuyến nghị tiêm vắc-xin RSV trong thời kỳ mang thai.

Do đó, hiện nay có ba loại vắc-xin được khuyến nghị tiêm định kỳ cho phụ nữ mang thai:

Vaccine	Thời gian khuyến cáo
Cúm	Bất cứ lúc nào trong thời kỳ mang thai
Ho gà	Lý tưởng nhất là ở tuần thứ 20 đến 32 của thai kỳ (cùng với vắc-xin bệnh bạch hầu và uốn ván)
RSV	Khi mang thai từ tuần thứ 28 đến tuần 36

Vui lòng trao đổi với chuyên gia y tế của bạn để biết thời điểm tốt nhất để tiêm vắc-xin.

Có nhiều bằng chứng chứng minh sự an toàn của việc tiêm chủng trong thai kỳ. Các nghiên cứu lâm sàng không tìm thấy bằng chứng cho thấy những loại vắc-xin này gây hại cho em bé đang phát triển. Tất cả các loại vắc-xin được phê duyệt sử dụng ở Úc đã được đánh giá là mang lại lợi ích vượt trội hơn so với các rủi ro.



Tìm hiểu thêm về
tiêm chủng cho phụ
nữ mang thai





ABRYSVO được tiêm dưới dạng một mũi duy nhất trong thời gian từ tuần thứ 28 đến tuần 36 của thai kỳ, giúp bảo vệ em bé của bạn chống lại bệnh đường thở và phổi do RSV gây ra. Vắc-xin này cũng có thể được dùng cho người lớn từ 60 tuổi trở lên.

Như bất kỳ loại vắc-xin khác, ABRYSVO có thể không thể bảo vệ hoàn toàn được tất cả những người đã tiêm và có thể gây ra tác dụng phụ. Các tác dụng phụ phổ biến nhất bao gồm: đau, sưng hoặc đỏ tấy xung quanh vùng tiêm, đau cơ và nhức đầu. Nếu bạn gặp tác dụng phụ, chúng thường nhẹ và chỉ tạm thời.

Các bé sơ sinh được theo dõi trong suốt hai năm đầu sau sinh cho thấy ABRYSVO không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào.

▼ Vắc-xin này phải được giám sát bổ sung. Điều này cho phép xác định nhanh và cập nhật mới về thông tin liên quan đến an toàn. Bạn có thể hỗ trợ bằng cách báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nào mà bạn nhận được. Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho bác sĩ hoặc báo cáo trực tiếp tại www.tga.gov.au/reporting-problems.



Để biết thêm thông tin về ABRYSVO, vui lòng đọc Thông tin thuốc dành cho người tiêu dùng



Trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về ABRYSV0 hoặc các câu hỏi liên quan đến cách ABRYSV0 có thể giúp bảo vệ em bé của bạn chống lại RSV.

Tài liệu đọc thêm

Thông tin bổ sung về RSV có thể được tìm thấy qua Pfizer Your Health:



Tiêm chủng
cho bà mẹ



Tiết lộ về RSV



Xin lưu ý rằng tài liệu này nhằm cung cấp thông tin giáo dục cơ bản về RSV và ABRYSV0. Để biết thêm thông tin hoặc được tư vấn y tế, vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

© 2025 Pfizer Australia Pty Ltd. Sydney, Australia. All rights reserved.

Pfizer Medical Information: 1800 675 229.
PP-A1G-AUS-0510 September 2025.

